


# ナボリン<sup>®</sup>S 4週間服用臨床データ


## 肩こり

改善+軽度改善 **67%**




## 腰痛

改善+軽度改善 **67%**




## 眼精疲労

改善+軽度改善 **91%**




## 神経痛

改善 **75%**



## 五十肩

改善+軽度改善 **60%**



眼精疲労の症状をお持ちで、医療機関を受診した患者様を対象にナボリンSの臨床試験を実施しました。

副作用: 44例中7例(消化器症状、皮膚症状)  
出典: ナボリンS承認申請時添付データ

筋肉痛や関節痛(肩こり、腰痛、五十肩など)、神経痛の諸症状をお持ちで、医療機関を受診した患者さまを対象に、ナボリンSを4週間服用いただいた結果、上記の症状改善が見られました。

副作用: 50例中4例(消化器症状、皮膚症状)  
出典: ナボリンS承認申請時添付データ

ずーっと悩んでいる

# 肩こり、腰痛に

「ナボリン<sup>®</sup>S」が効く!



原因のひとつは **末梢神経のダメージ** かも

こんな時に、飲んで効く



エイザイ  
独自開発

メコバラミン  
+ 葉酸 5mg

眼精疲労、肩こり、腰痛に

# ナボリン<sup>®</sup>S

第3類医薬品



■用法・用量  
成人(15歳以上)、1回1錠を1日3回食後に水またはお湯で服用してください。